

Strategie zur Verringerung des Resistenzrisikos von Kartoffelkäfern und Blattläusen in Kartoffeln gegen Neonicotinoide für das Jahr 2008

Fachausschuss Pflanzenschutzmittelresistenz – Insektizide, Akarizide

Strategie zur Verringerung des Resistenzrisikos von Kartoffelkäfern und Blattläusen in Kartoffeln gegen Neonicotinoide

Grundsätzliche Notwendigkeit einer Anti-Resistenzstrategie

Aus Sicht der Landwirtschaft, des Handels und der Beratung erscheint es dringend notwendig, in enger Abstimmung zwischen den Bundesbehörden, den Pflanzenschutzzstellen der Länder und den Anbietern von Insektiziden eine für die Kartoffel abgestimmte Bekämpfungsstrategie für Mittel mit Wirkstoffen aus der Gruppe der Neonicotinoide festzulegen.

Grundsätzlich ist eine Resistenzstrategie für eine Wirkstoffklasse dringend notwendig, wenn

- Risikoorganismen exponiert sind,
- mehrere Anwendungen mit gleichem Wirkstoff erfolgen können und
- mehrere Wirkstoffe und mehrere Mittel (u. U. auch mit demselben Wirkstoff) im Vertrieb sind.

Eine solche Resistenzstrategie muss folgendes berücksichtigen:

- den Anwendungszeitpunkt je nach Schadorganismus und das unterschiedliche Auftreten von Blattläusen und Kartoffelkäfern je Region
- die Persistenz und Wirkung der zugelassenen Insektizide mit ihren Indikationen und Auflagen
- evtl. vorhandenes Resistenzauftreten/Monitoringergebnisse
- die Biologie der auftretenden Schadorganismen
- die vorhandenen Alternativen (chemische und nicht chemische)
- alle relevanten Aspekte der Toxizität, Umweltwirkung und Wirkung auf Honigbienen

Die Resistenzstrategie muss außerdem zwischen einer für die Pflanzgutproduktion und einer für die Konsum- oder Industriekartoffelproduktion unterscheiden, da sich die Anwendungshäufigkeiten in diesen Produktionszweigen deutlich unterscheiden.

Resistenzrisiko gegen Neonicotinoide

Im deutschen Markt sind zurzeit 5 verschiedene neonicotinoide Wirkstoffe (Imidacloprid, Acetamiprid, Thiacloprid, Clothianidin, Thiametoxam) in Pflanzenschutzmitteln zugelassen. Der Vertrieb erfolgt durch verschiedene Firmen. Je nach Kultur und Schadtier ist die Anwendung mehrerer dieser Wirkstoffe in einer Kultur und gegen die gleichen Schadorganismen zugelassen, was zu hohem Selektionsdruck führen kann. Bei bekannten Resistzenzen von Schadtieren gegen Neonicotinoide lag jeweils Kreuzresistenz zwischen den Wirkstoffen vor.

In der Kartoffel gehören der Kartoffelkäfer und einige Blattlausarten (*Myzus persicae*, *Aphis frangulae*) zu den stark durch Resistenz gefährdeten Insekten. Beim Kartoffelkäfer wurde in verschiedenen Regionen Nordamerikas eine Resistenzentwicklung gegen Neonicotinoide nachgewiesen.

Folgende Wirkstoffe aus der Gruppe der Neonicotinoide sind zurzeit in Kartoffeln (Stand 27.02.2008) zugelassen:

- Imidacloprid: Pflanzgutbehandlung (gegen Blattläuse als Virusüberträger, Blattläuse und Kartoffelkäfer)
- Clothianidin: Pflanzgutbehandlung und Spritzungen (insgesamt max. 2 Anwendungen gegen Blattläuse als Virusüberträger und Kartoffelkäfer)
- Thiacloprid: 2 Spritzanwendungen (Blattläuse und Kartoffelkäfer)

- Thiamethoxam: 2 Spritzanwendungen (Blattläuse und Kartoffelkäfer), 4 Spritzanwendungen gegen Blattläuse als Virusüberträger

Daneben sind in Kartoffeln Mittel aus mehreren anderen Wirkstoffgruppen sowohl gegen Blattläuse als auch gegen Kartoffelkäfer zugelassen, die eine adäquate Resistenzstrategie für Neonicotinoide ermöglichen.

Von den Zulassungs- und Bewertungsbehörden, dem amtlichen Beratungsdienst der Länder und beteiligten Firmen empfohlene Resistenz-Strategie 2008 für den Einsatz von Neonicotinoiden in Kartoffeln

Ziel der empfohlenen Insektizid-Strategie ist eine Anti-Resistenzstrategie und gleichzeitig die Erzielung eines hinreichenden Bekämpfungserfolges.

Eine unterschiedliche Nutzung der zur Verfügung stehenden Mittel unter Beachtung der aktuellen Zulassungssituation wird je nach Zeitpunkt und Intensität des Auftretens der Schädlinge und des notwendigen Bienenschutzes bei Blattlausauftreten empfohlen.
Die Landwirte sind für die Umsetzung der Strategie im Sinne der guten fachlichen Praxis mit verantwortlich. Sie müssen die Empfehlungen aktiv unter Nutzung aller zugelassener Mittel umsetzen. Dabei muss vor allem folgendes beachtet werden:

- strikte Beachtung von Bekämpfungsrichtwerten (keine unnötigen Anwendungen und Beimischungen von Insektiziden),
- nur Nutzung von adäquater Spritztechnologie und genügendem Wasseraufwand und vollen Aufwand-mengen,
- strikte Berücksichtigung des Bienenschutzes,
- Auswahl eines Mittels innerhalb einer Wirkstoffklasse mit möglichst guter Wirksamkeit.

Mittelpalette zur Spritzung von Insektiziden in Kartoffel: Stand 27.02.2008:

| Wirkstoffgruppe | IRAC Resistenz Gruppe | Kartoffel- käfer | Blatt- läuse | Blattläuse als Virusüber-träger | Mittel (teils auch mit anderen Namen) |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| Pyrethroide | 3 | X | X | X | Karate Zeon, Trafo WG |
| | | X | | X | Fastac SC Super Contact, Bulldock, Decis flüssig, Spruzit Schädlingsfrei |
| Neonicotinoide | 4A | X | X | X | Sumicidin Alpha EC, Talstar 8 SC |
| | | | | X | Biscaya |
| | | X | X | X | Gaucho 600 FS |
| | | X | | X | Monceren G |
| Organophosphor- verbindungen | 1B | X | | X | Dantop |
| | | X | X | X | Actara |
| | | X | | X | Tamaron |
| | | | | X | |
| Carbamate | 1A | | X | X | Pirimor Granulat |
| Flonicamide | 9C | | X | | TEPPEKI |
| Pymetrozine | 9B | | X | X | Plenum 50 WG |
| Azadirachtine | 18B | X | | | NeemAzal-T/S |
| Bac. thuringiensis | 11C | X | | | Novodor FC |
| Metaflumizone | 22B | X | | | Alverde |

Empfohlene Resistenzstrategie für Neonicotinoide in Kartoffel

Kartoffel, ohne Pflanzgutproduktion, (max. 2 - 3 Insektizidanwendungen notwendig, je nach Situation häufig auch keine oder nur 1 Anwendung je Jahr)

Pflanzgut wurde mit einem Neonicotinoid behandelt:

Zuerst Anwendung eines Insektizids mit anderem Wirkmechanismus, danach maximal 1 Spritzanwendung eines Neonicotinoids

Keine Pflanzgutbehandlung mit Neonicotinoid:

Max. 2 Spritzanwendungen eines Neonicotinoids unterbrochen durch Nutzung eines Insektizids mit anderem Wirkmechanismus

Wenn nur mit einer Anwendung je Jahr gerechnet wird, sollte der Wirkmechanismus zwischen den Jahren gewechselt werden.

Kartoffel, Pflanzgutproduktion (oft mehr als 5 Insektizidanwendungen notwendig)

Pflanzgut wurde mit einem Neonicotinoid behandelt:

Zuerst Anwendung eines Insektizids mit anderem Wirkmechanismus, danach maximal 2 Spritzanwendungen eines Neonicotinoids unterbrochen durch Nutzung eines Insektizids mit anderem Wirkmechanismus

Keine Pflanzgutbehandlung mit Neonicotinoid:

Max. 3 Spritzanwendungen eines Neonicotinoids unterbrochen jeweils durch Nutzung eines Insektizids mit anderem Wirkmechanismus

Die hier empfohlene Resistenzsituation kann auf andere Kulturen übertragen werden, wenn ähnliche Bedingungen (z.B. hinsichtlich Resistenz-Risikoorganismen, hohem Selektionsdruck, ähnlicher Insektizidpalette, Anzahl der Anwendungen in der Kultur) vorliegen.

Weiterentwicklung einer Resistenzstrategie für Neonicotinoide

Je nach den in den kommenden Jahren gesammelten Erfahrungen aus der Praxis, neu gewonnenen Versuchsdaten, neuen Erkenntnissen aus dem Resistenzmonitoring sowie der sich gegebenenfalls verändernden Zulassungssituation muss diese Strategie überdacht und gegebenenfalls neu angepasst werden.